

Przyczyn omdleń, ich charakterystycznych objawów czy sposobów na zmniejszenie ryzyka omdleń.

W załączeniu ulotka przygotowaną przez studentów z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Materiał zawiera najważniejsze informacje dotyczące m.in. przyczyn omdleń, ich charakterystycznych objawów czy sposobów na zmniejszenie ryzyka omdleń.

*Biuro Ministra
Ministerstwo Edukacji i Nauki*

Omdlenia

Omdlenia, które pojawiają się podczas długotrwałego przebywania w pozycji stojącej, nie stanowią zagrożenia dla Twojego zdrowia!

Bywają jednak źródłem lęku, niepokoju i dyskomfortu. W rzadkich przypadkach mogą prowadzić do urazów.



Ministerstwo
Edukacji i Nauki



WWW.MEIN.GOV.PL

Jeśli zdarzają Ci się zasnnięcia, utraty przytomności występujące w trakcie wysiłku lub w spoczynku z towarzyszącym bólem w klatce piersiowej, dusznością, kołataniem serca, koniecznie skonsultuj się z lekarzem!



Typowe bodźce wywołujące omdlenie:



- ból
- emocje
- widok lub pobieranie krwi
- dłuższe przebywanie w pozycji stojącej



Objawy poprzedzające omdlenie:



- zawroty głowy
- uczucie gorąca
- wzmożona potliwość
 - bladość
 - nudności
 - wymioty



Po upadku w wyniku omdlenia mogą wystąpić:



- pojedyncze ruchy kończyn lub twarzy
- okres nieprzytomności zwykle nie dłuższy niż minuta
- szybkie odzyskanie pełnej przytomności
- odczucie dużego zmęczenia po odzyskaniu przytomności



Zmniejszenie ryzyka omdlenia:



- unikaj odwodnienia – przed uroczystościami przyjmij odpowiednią ilość płynów, zjedz lekki posiłek
- unikaj sytuacji wywołujących omdlenie, np. przebywanie w gorących, zatłoczonych miejscach
- unikaj udziału w wydarzeniach związanych z długim stanem w pozycji pionowej, po niedawno przebytych infekcjach czy dużych wysiłkach



Co zrobić, gdy pojawią się objawy poprzedzające omdlenie?



usiądź lub połoń się, najlepiej unosząc nogi do góry



skrzyżuj nogi, zaciśnij pięści i napnij mięśnie kończyn górnych



zaciśnij pośladki i mocno wyprostuj nogi w kolanach



skrzyżuj nogi i przyciśnij je do siebie na całej długości

Co zrobić w przypadku nawracających epizodów omdleń?



- zwiększ spożycie płynów do przynajmniej 2 litrów na dobę
- zwiększ spożycie soli kuchennej
- skonsultuj się z lekarzem

Bibliografia:

Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia omdleń (2018) Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) ds. rozpoznawania i leczenia omdleń.

Praktyczne instrukcje do wytycznych ESC dotyczących rozpoznawania i leczenia omdleń (2018). W pkt 9, niniejszego artykułu dostępne są w języku polskim szczegółowe wytyczne dla pacjentów dotkniętych omdleniami wazgowagalnymi.

Ulotka powstała we współpracy z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu.